УДК 517.984

Об одном подходе к определению сингулярных дифференциальных операторов

А. А. Владимиров

Аннотация: На основе представления о тройках банаховых пространств даётся определение и характеризация основных свойств широкого класса граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного (в том числе нечётного) порядка с сингулярными коэффициентами.

arXiv:1701.08017v1 [math.SP] 27 Jan 2017

§ 1. Введение

1. В работе [**1**] была указана конструкция, позволяющая дать корректное определение ряда граничных задач для дифференциальных уравнений вида

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}(p_k y^{(n-k)})^{(n-k)} = f$$

с сингулярными коэффициентами $p_k \in W_2^{-k}[0,1]$. В случае $n = 2$ при этом было показано, что действие соответствующих неограниченных операторов в пространстве $L_2[0,1]$ допускает описание посредством систем обычных дифференциальных уравнений для абсолютно непрерывных функций. Применительно к задачам более высоких порядков аналогичные представления явным образом не указывались, хотя возможность такого указания в свете развитой теории была совершенно прозрачной. Значимость конструкции из [**1**] может быть продемонстрирована, например, развитым на её основе в работе [**2**] простым подходом к изучению осцилляционных свойств собственных функций сингулярных обыкновенных дифференциальных операторов — включая ряд так называемых «многоточечных» задач, рассмотрение которых ранее обычно проводилось с использованием весьма трудоёмких косвенных методов (см. имеющиеся в [**2**] ссылки).

Идеологические основы подхода работы [**1**] были заложены в более ранней работе [**3**], где схожим способом изучались дифференциальные уравнения второго порядка.

В последнее время интерес к этой тематике возобновился. Так, в работе [**4**] были — вне связи с подходом работы [**1**] — предложены регуляризованные представления для формально несколько более широкого, нежели рассмотренный в [**1**], класса дифференциальных уравнений чётного порядка. Поэтому представляется не лишённым интереса вопрос о расширении границ применения использованной в [**1**] методики. Характеризации некоторых возможных направлений такого расширения и посвящается настоящая статья.

2. Структура статьи имеет следующий вид. В § 2 даётся определение и указываются важнейшие свойства вспомогательных функциональных пространств, используемых далее при описании основных объектов изучения. В § 3 непосредственно определяются

Работа поддержана РФФИ, грант № 16-01-00706.

и исследуются операторы, отвечающие допустимым в рамках развиваемой теории граничным задачам для дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами. Наконец, в § 4 приводятся примеры приложения развитой теории к ряду конкретных ситуаций.

Все рассматриваемые далее линейные пространства предполагаются комплексными.

Наименьшим натуральным числом на всём протяжении статьи считается 0.

§ 2. Квазидифференциальные пространства Соболева

1. Пусть A — такая система функций класса $L_1[0,1]$, что для каждой пары натуральных индексов i и $j \leqslant i+1$ найдётся соответствующая ей функция $A_{ij} \in L_1[0,1]$. Символом $C^n_A[0,1]$ мы далее будем обозначать подпространство в пространстве $\{C[0,1]\}^{n+1}$ непрерывных вектор-функций с $n+1$ компонентами, выделенное системой понимаемых в смысле обобщённого дифференцирования уравнений

$$Y_i' = \sum_{j=0}^{i+1} A_{ij} Y_j, \qquad i < n. \tag{1}$$

Символом $W^n_{s,A}[0,1]$, где $n > 0$ и $s \in [1,\infty)$, мы будем обозначать результат пополнения пространства $C^n_A[0,1]$ по норме

$$\|Y\|_{W^n_{s,A}[0,1]} \rightleftharpoons \sum_{i=0}^{n-1} \|Y_i\|_{C[0,1]} + \left(\int_0^1 |A_{n-1,n}| \cdot |Y_n|^s \, dx \right)^{1/s}.$$

Наконец, символами $\overset{\circ}{C}{}^n_A[0,1]$ и $\overset{\circ}{W}{}^n_{s,A}[0,1]$ мы будем обозначать подпространства, получаемые замыканием в пространствах $C^n_A[0,1]$ и $W^n_{s,A}[0,1]$, соответственно, множеств принадлежащих этим пространствам финитных на интервале $(0,1)$ вектор-функций. Тривиальным образом имеет место следующий факт:

1.1. *Если при каждом $i < n$ первообразная функции $|A_{i,i+1}|$ строго монотонна, то естественное вложение $Y \mapsto Y_0$ пространства $W^n_{1,A}[0,1]$ в пространство $C[0,1]$ является инъективным.*

Обычные соболевские пространства $W^n_s[0,1]$ и $\overset{\circ}{W}{}^n_s[0,1]$, где $s \in [1,\infty)$, в рамках изложенной конструкции отвечают (с точностью до выбора эквивалентной нормы) ситуации

$$A_{ij}(x) \equiv \begin{cases} 1 & \text{при } j = i+1, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

2. Обозначим символом M_n решение понимаемой в смысле обобщённого дифференцирования начальной задачи

$$(M_n)'_{ij} = \sum_{k=0}^{\inf\{n-1,i+1\}} A_{ik} \cdot (M_n)_{kj}, \qquad (M_n)_{ij}(0) = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{иначе,} \end{cases}$$

где каждый из индексов i и j пробегает промежуток $\{0,\dots,n-1\}$. Очевидным образом, каждая из функций $(M_n)_{ij}$ принадлежит классу $W^1_1[0,1]$. Сопоставляя в каждой точке $x \in [0,1]$ имеющей размер $n \times n$ матрице элементов $(M_n)_{ij}(x)$ обратную матрицу

элементов $(M_n^{-1})_{ij}(x)$, получаем набор также принадлежащих классу $W_1^1[0,1]$ функций $(M_n^{-1})_{ij}$. При этом всякая вектор-функция $Y \in W_{1,A}^n[0,1]$ восстанавливается по своей последней компоненте согласно правилам

$$(1) \qquad Y_i(x) = \sum_{j=0}^{n-1} (M_n)_{ij}(x) \cdot \left[Y_j(0) + \int_0^x A_{n-1,n}(t) \cdot (M_n^{-1})_{j,n-1}(t) Y_n(t)\, dt \right], \qquad i < n.$$

2.1. *Пусть при некотором $n > 0$ первообразная функции $|A_{n-1,n}|$ строго монотонна. Тогда естественное вложение пространства $C_A^n[0,1]$ в пространство $C_A^{n-1}[0,1]$ имеет плотный образ.*

Доказательство. Зафиксируем произвольную вектор-функцию $Y \in C_A^{n-1}[0,1]$ и поставим ей в соответствие вектор-функцию $\Phi \in \{C[0,1]\}^n$ вида

$$\Phi_i(x) \equiv Y_i(x) - \int_0^x \left[\sum_{j=0}^{\inf\{n-1,i+1\}} A_{ij}(t) Y_j(t) \right] dt, \qquad i < n.$$

Зафиксируем также последовательность $\{Y_\alpha\}_{\alpha=0}^\infty$ вектор-функций класса $C_A^n[0,1]$, удовлетворяющих при $i < n$ равенствам $(Y_\alpha)_i(0) = Y_i(0)$ и таких, что первообразные суммируемых функций $A_{n-1,n} \cdot (Y_\alpha)_n$ равномерно стремятся при $\alpha \to \infty$ к функции Φ_{n-1}. Из представления (1) и соотношений $(M_n^{-1})_{j,n-1} \in W_1^1[0,1]$ тогда немедленно вытекает факт равномерной сходимости функциональных последовательностей $\{(Y_\alpha)_i\}_{\alpha=0}^\infty$, где $i < n$. Тривиальные тождества

$$Y_{n-1}(0) + \int_0^x A_{n-1,n}(t)(Y_\alpha)_n(t)\, dt = (Y_\alpha)_{n-1}(x) - \int_0^x \left[\sum_{j=0}^{n-1} A_{n-1,j}(t)(Y_\alpha)_j(t) \right] dt$$

вместе с известными общими свойствами интегральных уравнений первого рода означают теперь, что пределом последовательности образов вектор-функций $Y_\alpha \in C_A^n[0,1]$ является в точности исходная вектор-функция $Y \in C_A^{n-1}[0,1]$. □

2.2. *Пусть при некотором $n > 0$ первообразная функции $|A_{n-1,n}|$ строго монотонна, а набор суммируемых функций $\{f_j\}_{j=0}^n$ удовлетворяет тождеству*

$$(2) \qquad (\forall Y \in \overset{\circ}{C}{}_A^n[0,1]) \qquad \sum_{j=0}^n \int_0^1 f_j \overline{Y_j}\, dx = 0.$$

Тогда существует функция $h \in W_1^1[0,1]$, при почти всех $x \in [0,1]$ удовлетворяющая равенствам $f_n(x) = \overline{A_{n-1,n}(x)}\, h(x)$. При этом справедливо также тождество

$$(\forall Y \in \overset{\circ}{C}{}_A^{n-1}[0,1]) \qquad \sum_{j=0}^{n-1} \int_0^1 g_j \overline{Y_j}\, dx = 0,$$

где положено

$$g_j \rightleftharpoons \begin{cases} f_j - \overline{A_{n-1,j}}\, h, & \text{при } j < n-1, \\ f_{n-1} - \overline{A_{n-1,n-1}}\, h - h', & \text{при } j = n-1. \end{cases}$$

Доказательство. С учётом представления (1), заведомо найдётся функция $\varphi \in W_1^1[0,1]$, удовлетворяющая тождеству

$$(\forall Y \in \overset{\circ}{C}{}_A^n[0,1]) \qquad \int_0^1 [f_n + \overline{A_{n-1,n}\,\varphi}]\,\overline{Y_n}\,dx = 0.$$

Функция $f_n + \overline{A_{n-1,n}\varphi} \in L_1[0,1]$ при этом заведомо принадлежит линейной оболочке набора $\{\overline{A_{n-1,n}\cdot(M_n^{-1})_{j,n-1}}\}_{j=0}^{n-1}$, что автоматически означает существование функции $h \in W_1^1[0,1]$ с требуемым свойством. Выражая теперь, с использованием определения 1 (1), в тождестве (2) суммируемую функцию $A_{n-1,n}Y_n$ через функции набора $\{Y_i\}_{i=0}^{n-1}$ и интегрируя по частям, убеждаемся в справедливости соотношения

$$(\forall Y \in \overset{\circ}{C}{}_A^n[0,1]) \qquad \sum_{j=0}^{n-1} \int_0^1 g_j \overline{Y_j}\,dx = 0.$$

Учёт утверждения 2.1 завершает доказательство. □

3. Символом $Y^\wedge \in \mathbb{C}^{2n}$, где $Y \in W_{1,A}^n[0,1]$, мы далее будем обозначать вектор граничных значений

$$Y_k^\wedge \rightleftharpoons \begin{cases} Y_k(0) & \text{при } k < n, \\ Y_{k-n}(1) & \text{иначе.} \end{cases}$$

На основе произвольно фиксированной матрицы $U \in \mathbb{C}^{2n\times 2n}$ могут быть определены подпространства $C_{A,U}^n[0,1]$ и $W_{s,A,U}^n[0,1]$, выделенные, соответственно, внутри $C_A^n[0,1]$ и $W_{s,A}^n[0,1]$ системой граничных условий $UY^\wedge = 0$.

На указанных подпространствах могут быть заданы полулинейные функционалы вида

$$(1) \qquad \langle F, Y\rangle \equiv \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=0}^{n} \int_0^1 f_i \overline{Y_i}\,dx & \text{при } Y \in C_{A,U}^n[0,1], \\ \displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \int_0^1 f_i \overline{Y_i}\,dx + \int_0^1 |A_{n-1,n}|^{1/s}\, f_n \overline{Y_n}\,dx & \text{при } Y \in W_{s,A,U}^n[0,1], \end{cases}$$

где $f_i \in L_1[0,1]$. В случае рассмотрения пространства $W_{s,A,U}^n[0,1]$ здесь дополнительно предполагается, что выполнено условие $f_n \in L_{s/(s-1)}[0,1]$, причём для почти любого $x \in [0,1]$ из равенства $A_{n-1,n}(x) = 0$ следует равенство $f_n(x) = 0$. Первообразные всех функций $|A_{i,i+1}|$, где $i < n$, мы на протяжении настоящего пункта считаем строго монотонными. Из представления 2 (1) немедленно вытекает, что всякий функционал вида (1) может быть переписан в форме

$$(2) \qquad \langle F, Y\rangle \equiv \begin{cases} \displaystyle\int_0^1 g\overline{Y_n}\,dx + \sum_{i=0}^{n-1} \mu_i \overline{Y_i(0)} & \text{при } Y \in C_{A,U}^n[0,1], \\ \displaystyle\int_0^1 |A_{n-1,n}|^{1/s}\, g\overline{Y_n}\,dx + \sum_{i=0}^{n-1} \mu_i \overline{Y_i(0)} & \text{при } Y \in W_{s,A,U}^n[0,1], \end{cases}$$

где $g \in L_1[0,1]$ в случае пространства $C_{A,U}^n[0,1]$, и $g \in L_{s/(s-1)}[0,1]$ в случае пространства $W_{s,A,U}^n[0,1]$. Из того же представления легко получается, что всякий функционал

вида (2) допускает обратную перезапись в форме (1). Сказанное означает замкнутость линейного множества функционалов вида (1) в сопряжённом к рассматриваемому пространстве. Из известной теоремы об общем виде полулинейного непрерывного функционала на лебеговском пространстве легко выводится также, что в случае пространства $W^n_{s,A,U}[0,1]$ множество функционалов вида (1) в точности совпадает с сопряжённым пространством.

Пространство заданных на $C^n_{A,U}[0,1]$ функционалов вида (1) мы будем далее обозначать символом $W^{-n}_{1,A,U}[0,1]$. Аналогичным образом, пространство таких функционалов, заданных на $W^n_{s,A,U}[0,1]$, мы будем обозначать символом $W^{-n}_{s/(s-1),A,U}[0,1]$.

§ 3. Сингулярные дифференциальные операторы

1. Пусть B — система функций, обладающая аналогичными системе A свойствами и такая, что при почти всех $x \in [0,1]$ равенства $A_{n-1,n}(x) = 0$ и $B_{m-1,m}(x) = 0$ равносильны. Пусть также зафиксирован параметр $s \in [1,+\infty)$, две матрицы $V \in C^{2m\times 2m}$, $Q \in \mathbb{C}^{2m\times 2n}$ и система функций со следующими свойствами:

- $p_{nm}, p_{nm}^{-1} \in L_\infty[0,1]$.
- $p_{im} \in L_{s/(s-1)}[0,1]$ при $i < n$, причём в случае $s \neq 1$ для почти любого $x \in [0,1]$ из равенства $B_{m-1,m}(x) = 0$ следует равенство $p_{im}(x) = 0$.
- $p_{nj} \in L_s[0,1]$ при $j < m$, причём для почти любого $x \in [0,1]$ из равенства $A_{n-1,n}(x) = 0$ следует равенство $p_{nj}(x) = 0$.
- $p_{ij} \in L_1[0,1]$ при $i < n$ и $j < m$.

Тогда может быть задан ограниченный оператор $T\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$ вида

$$(1)\quad \langle TY, Z\rangle \equiv \int_0^1 |A_{n-1,n}|^{1/s}\cdot|B_{m-1,m}|^{(s-1)/s}\, p_{nm}Y_n\overline{Z_m}\,dx + \sum_{i=0}^{n-1}\int_0^1 |B_{m-1,m}|^{(s-1)/s}\, p_{im}Y_i\overline{Z_m}\,dx + \sum_{j=0}^{m-1}\int_0^1 |A_{n-1,n}|^{1/s}\, p_{nj}Y_n\overline{Z_j}\,dx + \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1}\int_0^1 p_{ij}Y_i\overline{Z_j}\,dx + \langle QY^\wedge, Z^\wedge\rangle.$$

1.1. *Всякий оператор T вида (1) фредгольмов индекса $n - m - \operatorname{rank} U + \operatorname{rank} V$.*

Доказательство. Справедливость доказываемого утверждения легко устанавливается на основе представления § 2.2 (1), а также факта наличия у оператора $\hat{T}\colon L_s([0,1];|A_{n-1,n}|) \to L_s([0,1];|B_{m-1,m}|)$ вида

$$\hat{T}y \rightleftharpoons \left|\frac{A_{n-1,n}}{B_{m-1,m}}\right|^{1/s} p_{nm}y$$

обратного с оценкой нормы $\operatorname{vrai}\sup_{x\in[0,1]}|p^{-1}_{nm}(x)|$. □

2. Результаты предыдущего параграфа показывают, что в случае строгой монотонности первообразных функций $|B_{j,j+1}|$ уравнения $TY = F$ допускают эквивалентную

запись в форме граничных задач для систем дифференциальных уравнений для абсолютно непрерывных функций. А именно, для искомого решения $Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]$ с очевидностью могут быть определены квазипроизводные $y^{[i]} \rightleftharpoons Y_i \in W^1_1[0,1]$, где $i < n$, удовлетворяющие системе уравнений

$$(y^{[i]})' = \sum_{j=0}^{i+1} A_{ij} y^{[j]}, \qquad i < n-1. \tag{1}$$

Далее, из утверждения § 2.2.2 вытекает существование квазипроизводной $y^{[n]} \in W^1_1[0,1]$, удовлетворяющей соотношению

$$|A_{n-1,n}|^{1/s} Y_n = p_{nm}^{-1} \cdot \left[\frac{\overline{B_{m-1,m}}}{|B_{m-1,m}|^{(s-1)/s}} \cdot y^{[n]} - \sum_{i=0}^{n-1} p_{im} y^{[i]} + f_m \right], \tag{2}$$

а тогда и уравнению

$$\begin{aligned}(y^{[n-1]})' = \sum_{i=0}^{n-1} \left[A_{n-1,i} - \frac{p_{nm}^{-1} p_{im}\, A_{n-1,n}}{|A_{n-1,n}|^{1/s}} \right] \cdot y^{[i]} + \\ + \frac{p_{nm}^{-1} A_{n-1,n} \overline{B_{m-1,m}}}{|A_{n-1,n}|^{1/s}\, |B_{m-1,m}|^{(s-1)/s}} \cdot y^{[n]} + \frac{p_{nm}^{-1} A_{n-1,n} f_m}{|A_{n-1,n}|^{1/s}}.\end{aligned} \tag{3}$$

Наконец, утверждение § 2.2.2 вместе с соотношением (2) означают существование квазипроизводных $y^{[n+m-j-1]} \in W^1_1[0,1]$, где $j < m-1$, подчиняющихся уравнениям

$$\begin{aligned}(y^{[n+m-j-1]})' = \sum_{i=0}^{n-1} \left[p_{ij} - p_{nm}^{-1} p_{im} p_{nj} \right] \cdot y^{[i]} + \\ + \left[p_{nm}^{-1} \cdot \frac{\overline{B_{m-1,m}}}{|B_{m-1,m}|^{(s-1)/s}} \cdot p_{nj} - \overline{B_{m-1,j}} \right] \cdot y^{[n]} - \\ - \sum_{k=\sup\{j,1\}}^{m-1} \overline{B_{k-1,j}} y^{[n+m-k]} - f_j + p_{nm}^{-1} p_{nj} f_m, \qquad j < m.\end{aligned} \tag{4}$$

При этом, очевидным образом, оказывается справедливым тождество

$$\langle TY - F, Z \rangle \equiv \langle QY^\wedge - Y^\vee, Z^\wedge \rangle,$$

где положено

$$Y_k^\vee \rightleftharpoons \begin{cases} y^{[n+m-k-1]}(0) & \text{при } k < m, \\ -y^{[n+2m-k-1]}(1) & \text{иначе.} \end{cases}$$

Соответственно, исходное уравнение $TY = F$ равносильно системе дифференциальных уравнений (1), (3) и (4), рассмотренной совместно с набором граничных условий

$$UY^\wedge = 0, \qquad QY^\wedge - Y^\vee \in \operatorname{im} V^*.$$

3. Пусть теперь для рассматриваемых пространств $W^n_{s,A,U}[0,1]$ и $W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$, а также некоторого гильбертова пространства $\mathfrak{H}$, зафиксированы вложения $I\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to \mathfrak{H}$

и $J\colon \mathfrak{H} \to W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$. В этом случае оператор T задаёт на пространстве $\mathfrak{H}$ линейное отношение $T^\bullet \rightleftharpoons J^{-1}TI^{-1}$ с графиком

$$\{(y,z) \in \mathfrak{H} \times \mathfrak{H} \ : \ (\exists Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]) \quad (IY = y)\,\&\,(TY = Jz)\}.$$

Если при некотором $\lambda \in \mathbb{C}$ оператор $T - \lambda JI$ является ограниченно обратимым, то очевидным образом определена также и ограниченная резольвента

$$(T^\bullet - \lambda)^{-1} = I \cdot (T - \lambda JI)^{-1} J. \tag{1}$$

Соответственно, график отношения $T^\bullet$ в этом случае заведомо замкнут. Если дополнительно резольвента (1) инъективна и имеет плотный образ, то отношение $T^\bullet$ представляет собой оператор с плотной областью определения.

3.1. *Если вложения $I\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to \mathfrak{H}$ и $J\colon \mathfrak{H} \to W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$ инъективны и имеют плотные образы, то допускающая представление (1) резольвента отношения $T^\bullet$ также инъективна и имеет плотный образ.*

3.2. *Пусть вложение $J\colon \mathfrak{H} \to W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$ инъективно, и пусть для некоторого ограниченного оператора $K\colon W^n_{1,A,U}[0,1] \to C^m_{B,V}[0,1]$ в случае $s = 1$ или $K\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to W^m_{s/(s-1),B,V}[0,1]$ в случае $s \neq 1$ справедливо тождество $\langle z, IY\rangle \equiv \langle Jz, KY\rangle$. Пусть также равенство $\langle TY, KY\rangle = 0$ возможно лишь в случае $Y = 0$. Тогда линейное отношение $T^\bullet$ представляет собой оператор. Если при этом индекс оператора T равен нулю, то существует ограниченный оператор T^{-1}, а область определения оператора $T^\bullet$ плотна в $\mathfrak{H}$.*

Доказательство. Если пара $(0,z) \in \mathfrak{H} \times \mathfrak{H}$ принадлежит графику отношения $T^\bullet$, то должна существовать вектор-функция $Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]$ со свойствами $TY = Jz$ и $IY = 0$. При этом, однако, должны выполняться также равенства

$$\begin{aligned}\langle TY, KY\rangle &= \langle Jz, KY\rangle \\ &= \langle z, IY\rangle \\ &= 0,\end{aligned}$$

согласно сделанным предположениям гарантирующие справедливость равенства $Y = 0$, а потому и равенства $z = 0$.

Далее, всякая вектор-функция $Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]$ со свойством $TY = 0$ заведомо удовлетворяет равенству $\langle TY, KY\rangle = 0$, а потому является нулевой. Соответственно, факт ограниченной обратимости оператора T в случае равенства его индекса нулю немедленно вытекает из альтернативы Фредгольма.

Наконец, если вектор $z \in \mathfrak{H}$ ортогонален образу оператора $IT^{-1}J$, то должны быть справедливы равенства

$$\begin{aligned}0 &= \langle z, IT^{-1}Jz\rangle \\ &= \langle Jz, KT^{-1}Jz\rangle \\ &= \langle T \cdot [T^{-1}Jz], K \cdot [T^{-1}Jz]\rangle,\end{aligned}$$

согласно сделанным предположениям гарантирующие выполнение равенства $T^{-1}Jz = 0$, а потому и равенства $z = 0$. □

3.3. *Пусть для некоторого ограниченного оператора* $K\colon W^n_{1,A,U}[0,1] \to C^m_{B,V}[0,1]$ *в случае* $s = 1$ *или* $K\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to W^m_{s/(s-1),B,V}[0,1]$ *в случае* $s \neq 1$ *справедливо тождество* $\langle z, IY\rangle \equiv \langle Jz, KY\rangle$, *и пусть числовая область значений оператора* K^*T *включается в некоторый сектор комплексной плоскости, имеющий вершиной точку* 0. *Тогда числовая область значений отношения* $T^\bullet$ *включается в тот же сектор.*

Доказательство. Если пара $(y, z) \in \mathfrak{H} \times \mathfrak{H}$ принадлежит графику отношения $T^\bullet$, то должна существовать вектор-функция $Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]$ со свойствами $IY = y$ и $TY = Jz$. Выполняющиеся при этом равенства

$$\begin{aligned}\langle z, y\rangle &= \langle Jz, KY\rangle \\ &= \langle TY, KY\rangle\end{aligned}$$

как раз и гарантируют справедливость доказываемого утверждения. □

3.4. *Пусть вложение* $I\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to \mathfrak{H}$ *инъективно, для некоторого ограниченного оператора* $K\colon W^n_{1,A,U}[0,1] \to C^m_{B,V}[0,1]$ *в случае* $s = 1$ *или* $K\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to W^m_{s/(s-1),B,V}[0,1]$ *в случае* $s \neq 1$ *справедливо тождество* $\langle z, IY\rangle \equiv \langle Jz, KY\rangle$, *а оператор* K^*T *является симметрическим. Тогда при любом невещественном* $\lambda \in \mathbb{C}$ *оператор* $T - \lambda JI$, *если является фредгольмовым с нулевым индексом, обладает ограниченным обратным.*

Доказательство. В рассматриваемом случае для всякой вектор-функции $Y \in W^n_{s,A,U}[0,1]$ справедливо равенство

$$\operatorname{Im}\langle (T - \lambda JI)Y, KY\rangle = -\operatorname{Im}\lambda \cdot \|IY\|^2.$$

Соответственно, уравнение $(T-\lambda JI)Y = 0$ не может иметь нетривиальных решений, что, согласно альтернативе Фредгольма, как раз и означает справедливость доказываемого утверждения. □

Отметим в заключение, что, согласно утверждению § 2.1.3 работы **[5]**, в случае инъективности и плотности вложений $I\colon W^n_{s,A,U}[0,1] \to \mathfrak{H}$ и $J\colon \mathfrak{H} \to W^{-m}_{s,B,V}[0,1]$, а также непустоты резольвентного множества пучка $T^\natural\colon \lambda \mapsto T - \lambda JI$, спектр оператора $T^\bullet$ в точности совпадает со спектром пучка $T^\natural$.

§ 4. Примеры

1. В качестве первого примера рассмотрим задачу Дирихле для дифференциального уравнения

$$(py'')'' - (q'y')' + r''y = f \in L_2[0,1],$$

где $p, p^{-1} \in L_\infty[0,1]$ и $q, r \in L_2[0,1]$ (классический случай, когда коэффициенты p, q' и r'' предполагаются гладкими, связан с существенно более сильными ограничениями). Этой задаче отвечает оператор $T\colon \overset{\circ}{W}{}^2_2[0,1] \to \overset{\circ}{W}{}^{-2}_2[0,1]$ вида

$$\langle Ty, z\rangle \equiv \int_0^1 \left[(py'' - qy' + ry)\,\overline{z''} + (-qy'' + 2ry')\,\overline{z'} + ry''\overline{z}\right]\,dx.$$

Данный оператор имеет форму § 3.1 (1), и потому уравнение $T^\bullet y = f$ для соответствующего неограниченного оператора в пространстве $L_2[0,1]$ равносильно граничной задаче

$$\begin{aligned}
&(y^{[0]})' = y^{[1]},\\
&(y^{[1]})' = -p^{-1}ry^{[0]} + p^{-1}qy^{[1]} + p^{-1}y^{[2]},\\
&(y^{[2]})' = p^{-1}qry^{[0]} + (2r - p^{-1}q^2)y^{[1]} - p^{-1}qy^{[2]} - y^{[3]},\\
&(y^{[3]})' = -p^{-1}r^2y^{[0]} + p^{-1}qry^{[1]} + p^{-1}ry^{[2]} - f,\\
&\qquad y^{[0]}(0) = y^{[1]}(0) = y^{[0]}(1) = y^{[1]}(1) = 0.
\end{aligned}$$

Указанная система уравнений, ожидаемым образом, в точности совпадает с системой из леммы 2 работы [**1**].

Развитая выше теория, однако, может быть приложена и к случаю коэффициентов существенно более широкого вида. В частности, пусть коэффициент p^{-1} есть обобщённая производная некоторой строго возрастающей функции $H \in C[0,1]$, коэффициент q принадлежит классу $L_2([0,1];\, H')$, а коэффициент r — классу $L_2([0,1];\, H') \cap L_1[0,1]$. Тогда могут быть введены в рассмотрение функции $\xi, \eta \in W_1^1[0,1]$ со свойствами

$$\xi\left(\frac{x + H(x) - H(0)}{1 + H(1) - H(0)}\right) \equiv x, \qquad \eta\left(\frac{x + H(x) - H(0)}{1 + H(1) - H(0)}\right) \equiv H(x),$$

а также связанная с ними система суммируемых функций

$$A_{ij} \rightleftharpoons \begin{cases} \xi' & \text{при } i = 0,\ j = 1,\\ \eta' & \text{при } i = 1,\ j = 2,\\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Рассматриваемая задача получит при этом трактовку $T^\bullet y = f$, где действующий в пространстве $L_2[0,1]$ неограниченный оператор $T^\bullet = (I^*)^{-1} T I^{-1}$ строится на основе инъективного вложения $I\colon \mathring{W}_{2,A}^2[0,1] \to L_2[0,1]$ вида

$$[IY](x) \equiv Y_0\left(\frac{x + H(x) - H(0)}{1 + H(1) - H(0)}\right)$$

и оператора $T\colon \mathring{W}_{2,A}^2[0,1] \to \mathring{W}_{2,A}^{-2}[0,1]$ вида

$$\langle TY, Z\rangle \equiv \int_0^1 \left[\eta' \cdot (Y_2 - \sigma Y_1 + \rho Y_0)\,\overline{Z_2} + (-\eta'\sigma Y_2 + 2\xi'\rho Y_1)\,\overline{Z_1} + \eta'\rho Y_2\,\overline{Z_0}\right]\, dx,$$

где положено $\sigma \rightleftharpoons q \circ \xi$ и $\rho \rightleftharpoons r \circ \xi$. Результаты предыдущего параграфа позволяют теперь представить исходную задачу в форме

$$\begin{aligned}
&(y^{[0]})' = \xi' y^{[1]},\\
&(y^{[1]})' = -\eta'\rho y^{[0]} + \eta'\sigma y^{[1]} + \eta' y^{[2]},\\
&(y^{[2]})' = \eta'\sigma\rho y^{[0]} + (2\xi'\rho - \eta'\sigma^2)y^{[1]} - \eta'\sigma y^{[2]} - \xi' y^{[3]},\\
&(y^{[3]})' = -\eta'\rho^2 y^{[0]} + \eta'\sigma\rho y^{[1]} + \eta'\rho y^{[2]} - f \circ \xi,\\
&\qquad y^{[0]}(0) = y^{[1]}(0) = y^{[0]}(1) = y^{[1]}(1) = 0,
\end{aligned}$$

где $y^{[0]} = y \circ \xi$.

2. В качестве второго примера возьмём задачу периодического типа для дифференциального уравнения третьего порядка

$$-iy''' - (py')' + q'y = f \in L_2[0,1], \tag{1}$$

где $p, q \in L_1[0,1]$. В случае задач нечётного порядка естественным является рассмотрение ситуации $s = 1$, в отличие от типичного для чётного случая равенства $s = 2$. Соответственно, свяжем с задачей пару пространств

$$W^2_{1,A,U} \rightleftharpoons \{y \in W^2_1[0,1] \,:\, y(1) - y(0) = y'(1) - y'(0) = 0\},$$
$$C^1_{B,V} \rightleftharpoons \{y \in C^1[0,1] \,:\, y(1) - y(0) = 0\}.$$

Умножая обе стороны уравнения (1) на компоненту Z_0 произвольной вектор-функции $Z \in C^1_{B,V}[0,1]$, интегрированием по частям убеждаемся в справедливости равенства $T^\bullet y = f$, где отношение $T^\bullet$ отвечает оператору $T\colon W^2_{1,A,U}[0,1] \to W^{-1}_{1,B,V}[0,1]$ вида

$$\langle TY, Z\rangle \equiv \int_0^1 \left[(iY_2 + pY_1 - qY_0)\,\overline{Z_1} - qY_1\,\overline{Z_0}\right]\,dx.$$

Результаты предыдущего параграфа дают теперь для уравнения $T^\bullet y = f$ эквивалентное представление

$$\begin{gathered}(y^{[0]})' = y^{[1]},\\ (y^{[1]})' = -iqy^{[0]} + ipy^{[1]} - iy^{[2]},\\ (y^{[2]})' = -qy^{[1]} - f,\\ y^{[0]}(1) - y^{[0]}(0) = y^{[1]}(1) - y^{[1]}(0) = y^{[2]}(1) - y^{[2]}(0) = 0.\end{gathered}$$

На основе утверждений § 3.3.3 и § 3.3.4, с учётом наличия ограниченного вложения пространства $W^2_{1,A,U}[0,1]$ в пространство $C^1_{B,V}[0,1]$, легко показывается также, что в случае вещественнозначности коэффициентов $p, q \in L_1[0,1]$ неограниченный оператор $T^\bullet$ является самосопряжённым.

3. В качестве последнего примера рассмотрим задачу Дирихле для исследовавшегося в работах **[6]** и **[7]** уравнения

$$-\frac{d}{dG}\left(\frac{dy}{dH}\right) = f \in L_2([0,1];\, G'),$$

где $H \in C[0,1]$ есть некоторая неубывающая функция со свойствами $H(0) = H(1) - 1 = 0$, а неубывающая функция $G \in C[0,1]$ допускает представление $G(x) \equiv N(H(x))$. В этом случае решение задачи заведомо может быть записано в виде $y = Iu$, где вложение $I\colon \overset{\circ}{W}{}^1_2[0,1] \to L_2([0,1];\, G')$ — вообще говоря, не инъективное — подчиняется тождеству $[Iu](x) \equiv u(H(x))$. Кроме того, заведомо найдётся функция $g \in L_2([0,1];\, N')$, для которой композиция $g \circ H$ будет совпадать в пространстве $L_2([0,1];\, G')$ с исходной правой частью f, а потому и подчиняться тождеству

$$(\forall v \in \overset{\circ}{W}{}^1_2[0,1]) \qquad \langle I^* f, v\rangle = \int_0^1 g\overline{v}\,dN.$$

Соответственно, исходная задача допускает переформулировку $(I^*)^{-1}TI^{-1}y = f$, где $T\colon \overset{\circ}{W}{}_2^1[0,1] \to \overset{\circ}{W}{}_2^{-1}[0,1]$ есть обычный оператор двукратного дифференцирования

$$\langle Tu, v\rangle \equiv \int_0^1 u'\overline{v'}\,dx.$$

Утверждения § 3.3.2 и § 3.3.3 вместе с очевидным фактом положительности оператора T позволяют гарантировать корректную определённость, самосопряжённость и положительность действующего в пространстве $L_2([0,1];G')$ неограниченного оператора $T^\bullet \rightleftharpoons (I^*)^{-1}TI^{-1}$.

Литература

[1] А. А. Владимиров. *О сходимости последовательностей обыкновенных дифференциальных операторов* // Матем. заметки. — 2004. — Т. 75, № 6. — С. 941–943.

[2] А. А. Владимиров. *К вопросу об осцилляционных свойствах положительных дифференциальных операторов с сингулярными коэффициентами* // Матем. заметки. — 2016. — Т. 100, № 6. — С. 800–806.

[3] М. И. Нейман–заде, А. А. Шкаликов. *Операторы Шрёдингера с сингулярными потенциалами из пространств мультипликаторов* // Матем. заметки. — 1999. — Т. 66, № 5. — С. 723–733.

[4] К. А. Мирзоев, А. А. Шкаликов. *Дифференциальные операторы чётного порядка с коэффициентами-распределениями* // Матем. заметки. — 2016. — Т. 99, № 5. — С. 788–793.

[5] А. А. Владимиров. *Теоремы о представлении и вариационные принципы для самосопряжённых операторных матриц* // arXiv:1403.2253.

[6] U. Freiberg. *Refinement of the spectral asymptotics of generalized Krein Feller operators* // Forum Math. — 2011. — V. 23. — P. 427–445.

[7] А. А. Владимиров. *Об одном классе сингулярных задач Штурма–Лиувилля* // arXiv:1211.2009.